EFFECT OF MATURATION MEDIA SUPPLEMENTED WITH RETINOL OR ASCORBIC ACID OR α -TOCOPHEROL ON CUMULUS CELL EXPANSION AND *IN VITRO* NUCLEAR MATURATION OF BUFFALO OOCYTES.

Khalil, W.A.; M.A. El-Harairy; A.E. Abdel-Khalek; and Z.M.R.K. Palani.

Animal Production Dept., Faculty of Agric., Mansoura Univ.

تأثير بيئة الانضاج المضاف اليها الريتينول أو حمض الأسكوربيك أو ألفا
توكوفيرول على معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي والنضج النووي معملياً
لبويضات الجاموس

وانسل أحمد خليل، مصطفى عبد الحليم الحرايري، عبد الخالق السيد عبد الخالق و
زيرك محمد رستم خان بالاني.
قسم إنتاج الحيوان – كلية الزراعة – جامعة المنصورة.

الملخص

أجري هذا البحث بهدف دراسة تأثير إضافة كل من الريتينول (١٠ ميكرومول/مل) أو حمض الأسكوربيك (١٠٠ ميكرومول/مل) أو α -توكوفيرول (١٠٠ ميكرومول/مل) كمضادات أكسدة غير إنزيمية إلى بيئة الانضاج المعملي لبويضات الجاموس على الانضاج المعملي لبويضات الجاموس بقياس معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي ومعدل الانضاج النووي. تم جمع البويضات من مبايض الجاموس المذبوحة في المجازروإستزراع البويضات الجيدة والمقبولة في بيئة الانضاج المعملي (بيئة زراعة الأنسجة-١٩٩٩) مضافاً إليها الفيتامينات بالتركيزات المذكورة لمدة ٢٢ ساعة في حضانة ثاني أكسيد الكربون على درجة حرارة ٣٨,٥°م و٥% ثاني أكسيد كربون وأكثر من ٩٥% رطوبة. بعد عملية الانضاج تم تقييم معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي وكذلك معدل الانضاج النووي للبويضات. تشير النتائج إلى تحسن التمدد الكلي لخلايا التراكم المبيضي حيث كان أعلى تحسن في البيئة المضاف اليها α توكوفيرول، حمض الأسكوربيك والريتينول (٧٧,٢، ٦٩,٤ و ٦٩,٢%، على التوالي) مقارنة بالبيئة القياسية (٦٠,٢%) ولم تكن الفروق معنوية. أيضاً كان أعلى معدل انضاج نووي (مجموع كل من البويضات التي وصلت إلى الطور الانفصالي الأول والطور النهائي الأول والطور الإستوائي الثاني) معنوياً للبيئات المضاف اليها الريتينول، α -توكوفيرول والأسكوربيك (٨٣,٤٨، ٨٢,٢٣ و ٨١,٩٤%، على التوالي) مقارنة بالبيئة القياسية ٦٨,٤٦%.

نستخلص من هذه النتائج أن إضافة كل من الريتينول أو حمض الأسكوربيك أو α -توكوفيرول كمضادات أكسدة غير إنزيمية إلى بيئة الانضاج المعملي تحسن من معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي وتزيد معدل الانضاج النووي معملياً لبويضات الجاموس. إضافة الريتينول أعطت أحسن معدل انضاج معملي لبويضات الجاموس.

الكلمات المفتاحية: الجاموس، البويضات، الانضاج المعملي، مضادات الأكسدة غير الإنزيمية.

مقدمة

تعتبر عملية الانضاج المعملي خطوه هامه لنجاح عملية الإخصاب معملياً لبويضات الجاموس ومن العوامل التي تؤثر عليها إضافات البيئة، الموسم، حجم الحويصلات، طريقة الجمع، جودة البويضات، وجود خلايا التراكم المبيضي، حالة المبيض وطول مدة الانضاج (Mahmoud and Al-Shimaa, 2013). يعتبر الإجهاد الناتج عن الأكسدة أكبر مشكلة تواجه عملية الإخصاب المعملي (Guerin *et al.*, 2001) وقد عرف بعض الباحثين (Feugang *et al.*, 2004) الإجهاد الناتج عن الأكسدة على أنه ناتج من عدم التوازن بين إنتاج الشوارد الحرة المتضمنة للأوكسجين (Reactive oxygen species (ROS) ومضادات الأكسدة الخلوية. وتشمل هذه الشوارد الحرة المتضمنة للأوكسجين أيون فوق الأوكسيد (O_2^-) وفوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2) وأيونات الهيدروكسيل (OH^-) وتعتبر تلك المواد عقبة رئيسية أمام تطور الأجنة (Guerin *et al.*, 2001) حيث أنها تكون شديدة التفاعل مع جزيئات الخلايا المعقدة مثل الدهون والبروتينات والحمض النووي (DNA) وتسبب سلسلة من تعطيل الوظائف مثل عدم تنشيط

الإنزيمات (Halliwell and Gutteridge, 1989) وشذوذ الميتوكوندريا (Kowaltowski, 1999) وتجزئة الحمض النووي (Lopes et al., 1998).

توجد آليات الدفاع ضد الشوارد الحرة تشمل مضادات أكسده غير إنزيمية مثل الجلوتاثيون وفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) وفيتامين هـ (ألفا توكوفيرول) وفيتامين أ (الريتينول) والبيروكسيدات والهيبتورين بينما تشمل مضادات الأكسدة الإنزيمية الكاتاليز وسوبر أوكسيد ديسميوتاز والجلوتاثيون بيروكسيداز (Guerin et al. 2001).

يعتبر فيتامين هـ مضاد أكسده طبيعي، حيث يوجد فيتاميني α و γ هـ بكميات معنوية في المبيض أو السائل الحويصلي (Schweigert and Zucker, 1988). فيتامين هـ يثبط تخليق NADPH oxidase من أيونات فوق الأكسيد وتحمي مضادات الأكسدة الذاتية في الدهون (فيتامين هـ γ و α) غشاء الخلية من الإجهاد الناتج عن الأكسدة (Pascoe et al., 1987). ويعتبر فيتامين (أ) أحد المكونات الغذائية الدقيقة المهمة في تناسل الأبقار (Gomez et al., 2004). ويلعب دوراً في منع الإجهاد الناتج عن الأكسدة داخل الخلايا (Ahlemeyer et al., 2001). وتعتبر الريتينويدات منظّات للنمو الخلوي والتميز الجنيني للعديد من الخلايا وهي مهمة لإنتاج هرمونات المبيض الإسترويديه ونضج البويضات والتطور الجنيني المبكر (Thiyagarajan and Valivittan, 2009). كما يعتبر حمض الأسكوربيك من أهم مضادات الأكسدة التي توجد خارج الخلية (Warren et al., 2000) وهو مضاد أكسدة قوى ومباشر وعامل حماية ضد الضرر الناتج من الأكسدة الداخلية للـ DNA (Fraga et al., 1991).

لذلك كان الهدف من هذا البحث هو دراسة تأثير إضافة كل من الريتينول أو حمض الأسكوربيك أو α -توكوفيرول كمضادات أكسدة غير إنزيمية إلى بيئة الإنضاج المعملية على كل من معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي ومعدل الإنضاج النووي لبويضات الجاموس معملياً.

الطرق والمواد

أجريت هذه الدراسة في مختبر الفسيولوجي والتكنولوجيا الحيوية بقسم إنتاج الحيوان بكلية الزراعة جامعة المنصورة في الفترة من شهر أكتوبر (تشرين أول) ٢٠١٣ حتى شهر فبراير (شباط) ٢٠١٤.

جمع المبايض:

تم جمع المبايض من كل من المجازر الإليه بمحافظات القاهرة و المنوفية (شبين الكوم) وكانت المبايض طبيعية بينما كانت الحالة التناسلية للحيوانات المذبوحة (من حيث مرحلة دورة الشياخ) غير معروفة. كان يتم جمع المبايض بعد الذبح مباشرة وتوضع في محلول فسيولوجي (٠.٩ % كلوريد الصوديوم) على درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية ثم نقلها الى المجازر الى المختبر في خلال ٥-٦ ساعات.

غسل المبايض:

بعد نقل المبايض الى المختبر تم إزالة الأجزاء الزائدة من النسيج الضام حول المبيض وغسلها مرتين في محلول فسيولوجي دافئ وذلك لإزالة الدم المتجلط والأنسجة الزائدة ثم غسلها بكحول الإيثانيل (٧٠%) لعدة ثواني لإزالة أي تلوث على سطح المبيض ثم غسلها مرة أخيرة بمحلول فسيولوجي (٠.٩%) كلوريد الصوديوم).

جمع البويضات:

تم سحب السائل الحويصلي من الحويصلات المرئية على سطح المبيض ذات القطر من (٢ - ٨ مم) باستخدام إبرة قطر ٢٠ (مم) متصلة بسرنجة ١٠ مل معقمة تحتوي على ١ مل من بيئة الجمع (بيئة زراعة الأنسجة ١٩٩ مضاف إليها ٦مجم/مل الألبومين سيرم الأبقار و ٥٠ ميكروجرام/مل جنتاميسين). بعد عملية السحب كان يتم تفريغ محتويات السرنجة ببطء في طبق بتري معقم (٦٠ مم) وذلك لإجراء عملية البحث عن البويضات تحت الميكروسكوب الخاص بذلك وهو الإستريوميكروسكوب لتقدير العدد وتصنيف البويضات.

تقييم وتصنيف البويضات:

بعد جمع البويضات مباشرة تم غسلها ثلاث مرات في بيئة الجمع وتقييمها تحت الميكروسكوب المجسم بقوة تكبير (X١٠٠) ثم تصنيفها على حسب عدد خلايا التراكم المبيضي المحيطة بها وكذلك على أساس جودة السيتوبلازم الى خمس درجات: البويضات المنمجة (الجيدة): محاطة بـ ٥ طبقات أو أكثر من خلايا التراكم المبيضي وذات سيتوبلازم متماثل ومتجانس ولونه ترابي (صوره ١). البويضات الأقل إندمجاً (مقبولة):

محاطة بـ ١-٤ طبقات من خلايا التراكم المبيضي وذات سيتوبلازم متجانس ولونه ترابي (صوره ٢). البويضات المعراة جزئياً؛ عليها جزء عاري من خلايا التراكم المبيضي ومحاطة جزئياً بخلايا التراكم المبيضي (صوره ٣). البويضات المعراة كلياً: غير محاطة بأي طبقه من طبقات خلايا التراكم المبيضي ومحاطة فقط بالطبقة الشفافة (صوره ٤). البويضات المضمحلة: وهى ذات سيتوبلازم به أماكن مظلمة أو السيتوبلازم منكش أو به فراغات (صوره ٥). وتعتبر البويضات المعراة والمضمحلة غير صالحة للإنضاج المعلى لذلك يتم إستبعادها.

صوره (١): بويضات مندمجة
صوره (٢): بويضات أقل اندماجا
صوره (٣): بويضات معراة جزئياً
صوره (٤): بويضات معراة كلياً
صوره (٥): بويضات مضمحلة

إنضاج البويضات:

كان يتم إعداد بيئة الإنضاج في اليوم الذي يتم فيه جمع البويضات ويوضح الجدول (١) تركيب البيئة المستخدمة في الإنضاج المعلى. كان يتم ضبط البيئة على درجة حموضة pH من ٧,٢ الى ٧,٤ وترشيحها عن طريق فلتر قطره ٠,٢٢ ميكرومتر.

بعد جمع وتقييم وتصنيف البويضات تم اختيار البويضات الجيدة والمقبولة (المندمجة والأقل اندماجا) وغسلها مرة واحدة في بيئة الإنضاج المعلى ثم نقلها الى بيئة الإنضاج المعلى في حضانة ثاني اوكسيد الكربون على درجة حرارة ٣٨,٥ م° و ٥٠% CO₂ واكثر من ٩٥% رطوبة وذلك لتحسينها لمدة ٢٢ ساعة.

جدول (١): تركيب بيئة الإنضاج المعلى.

محتويات البيئة	التركيز	الشركة المنتجة
بيئة زراعة الأنسجة-١٩٩	١٠ مل	Egyp. Orgn. Biol. Prod, Vacc.
البليومين سيرم الأبقار	٦ مجم/ مل	Sigma Chemi. Co.
صوديوم بيروفات	٢٠ ملليمول (نهائي)	Sigma Chemi. Co.
رمون التطور الحويصلي FSH	٥ ميكرو جرام/ مل	Follitropin; Bioniche Animal Health, Belleville, ON, Canada
هرمون الأم الحامل HCG	١٠ وحدة دولية/ مل	Egyptian Int. pharmaceutical Industries Co.
هرمون الإستراديول-١٧β	١ ميكرو جرام/ مل	Sigma Chemi. Co.
جنتاميسين (مضاد حيوي)	٥٠ ميكرو جرام/ مل	Sigma Chemi. Co.

المعاملات التجريبية:

تم تجهيز ٤ انواع من البيئات المستخدمة في الإنضاج (٤ معاملات) كالآتي: المعاملة الأولى (القياسية): بيئة الإنضاج بدون أى إضافات. المعاملة الثانية: بيئة الإنضاج مضاف إليها فيتامين أ (الريتينول) بتركيز ١٠ ميكرومول. المعاملة الثالثة: بيئة الإنضاج مضاف إليها فيتامين ج (حمض الأسكوربيك) بتركيز ١٠٠ ميكرومول. المعاملة الرابعة: بيئة الإنضاج مضاف إليها فيتامين هـ (توكوفيرول) بتركيز ١٠٠ ميكرومول.

تصنيف البويضات بعد الانضاج حسب درجة تمدد خلايا التراكم المبيضي (الأنضاج الستوبلازمي):

تم حساب النسبة المئوية للبويضات للتصنيفات التالية:

بويضات التمدد الكلى: وفيها يحدث تفكك لكل خلايا التراكم المبيضي (صوره ٦).

بويضات التمدد الجزئي: وفيها يحدث تفكك للطبقات الخارجية من خلايا التراكم المبيضي (صوره ٧).

بويضات بدون تمدد خلايا التراكم المبيضي: (صوره ٨).

صوره رقم (٧): بويضات التمدد الجزئي لخلايا التراكم المبيضي

صوره رقم (٦): بويضات التمدد الكلي لخلايا التراكم المبيضي

صوره رقم (٨): بويضات بدون تمدد لخلايا التراكم المبيضي

تثبيت البويضات وعملية الصبغ:

في نهاية عملية الانضاج المعملية تم إزالة البويضات من بيئة الانضاج وإزالة خلايا التراكم المبيضي من حول البويضة وذلك عن طريق تكرار عملية السحب والطرْد. تم سحب من ٥-١٠ بويضات ووضعها على شريحة زجاجية نظيفة ثم تغطيتها بغطاء شرائح بوضع عليه شمع برفين في الأربع أركان. وبعد ذلك كان يتم الضغط على غطاء الشريحة تحت الميكروسكوب وذلك حتى يتم تثبيت البويضات جيداً. كانت تتم عملية التثبيت بوضع الشريحة في مخلوط طازج مكون من حامض الخليك الثلجي وكحول الإيثانول بنسبة ١:٣ (حجم : حجم) لمدة ٢٤-٤٨ ساعة. بعد ذلك يتم صبغ الشرائح بصبغة الأسييتو أورسين (١%) عبارة عن (١% صبغة أورسين تضاف إلى ٤٠% حامض خليك ثلجي (وزن : حجم) وذلك لعدة دقائق (٢-٣ دقائق) ثم تغسل بعد ذلك بالأسيتوجليسرول وهو عبارة عن ماء مقطر وحامض الخليك الثلجي وجليسرول بنسبة ٣:١:١ (حجم:حجم:حجم) ثم تفحص تحت الميكروسكوب الضوئي بقوة تكبير (X٤٠٠) لتقييم البويضات في المراحل المختلفة من الانضاج النووي كالآتي:

الحويصلة الجرثومية (Germinal vesicle, GV):

وفيها تكون الكروموسومات مغلقة بالغشاء النووي.

الحويصلة الجرثومية المتكسرة (Germinal vesicle breakdown, GVBD):

وفيها يبدأ غياب الغشاء النووي المرئي وتكثيف للكروماتين والذي يميز بواسطة عنقود من مادة DNA بدون كروموسومات فردية.

الطور الاستوائي الأول (Metaphase-I, M-I):

وفيها تتكاثف الكروموسومات في أزواج بدون ظهور الجسم القطبي الأول (صوره ٩).

الطور الانفصالي الأول (Anaphase-I, A-I):

وفيها تبدأ الكروموسومات في الانفصال إلى مجموعتين مع ظهور خيوط المغزل (صوره ١٠).

الطور النهائي الأول (Telophase-I, T-I):

وفيها تنقسم الكروموسومات إلى مجموعتين (صوره ١١).

الطور الاستوائي الثاني (Metaphase-II, M-II):

وفيها تكون هناك مجموعة كبيرة من الكروموسومات تُكون الطور الاستوائي وتبقى الكروموسومات عالية التكثيف أو يحدث طرد للجسم القطبي الأول في اتجاه الطبقة الشفافة (صوره ١٢).

بويضات مضمحلة (Degenerated):

وفيها يكون الكروماتين متحوصلاً أو متبعثراً أو عالي التكثيف.

التحليل الأحصائي:

تم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام برنامج (SAS 2004) باستخدام الحاسب الآلي لدراسة التأثير الناتج عن إضافة الفيتامينات المختلفة إلى بيئة الانضاج المعملية على كل من معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي والانضاج النووي لبويضات الجاموس. تم مقارنة الفروق المعنوية باستخدام اختبار دانكن المتعدد

الحدود (Duncan, 1955). أيضا تم تحويل النتائج المتحصل عليها في صورة نسب مئوية عن طريق جداول الاركاسين ثم اعادتها مرة اخرى الى اصلها في الجداول المقدمة.

صوره (١٠): الطور الانفصالي الاول

صوره (٩): الطور الاستوائي الاول

صوره (١٢): الطور الاستوائي الثاني

صوره (١١): الطور النهائي الاول

النتائج

تأثير إضافة الفيتامينات على:

١- معدل تمدد خلايا التراكم المبيضى لبويضات الجاموس:

يوضح الجدول رقم (٢) تأثير إضافة الفيتامينات (الريتنيول أو حمض الأسكوربيك أو α توكوفيرول) إلى بيئة الإنضاج المعملية على معدل تمدد خلايا التراكم المبيضى لبويضات الجاموس. تظهر النتائج أنه لم يكن هناك فروق معنوية بين المعاملات في تمدد خلايا التراكم المبيضى، ولكن تشير النتائج إلى أن التمدد الكلى لخلايا التراكم المبيضى كان أعلى في البيئة المضاف إليها α -توكوفيرول، حمض الأسكوربيك والريتنيول (٧٧,٢، ٦٩,٤ و ٦٩,٢%، على التوالي) مقارنة بالبيئة القياسية (٦٠,٢%).

جدول (٢): تأثير إضافة الفيتامينات الى بيئة الانضاج المعمل على معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي لبويضات الجاموس.

الخطأ المعياري (±)	بيئة الانضاج المعمل				المعاملة
	توكوفيرول	حمض الاسكوربيك	الريتينول	القياسية	
-	٨٦	١٠٦	١١٥	١٠١	عدد البويضات
					النسبة المئوية للبويضات (%):
٤,٨	٧٧,٢	٦٩,٤	٦٩,٢	٦٠,٢	بويضات ذات تمدد كلي
٣,٣	١٥,٣	١٧,٣	١٦,٦	٢٢,٧	بويضات تمدد جزئي
٣,٧	٧,٦	١٣,٣	١٤,٣	١٧,١	بويضات غير ممتدة
٣,٧	٩٢,٥	٨٦,٧	٨٥,٧	٨٢,٩	تمدد كلي + تمدد جزئي

٢- الانضاج النووي لبويضات الجاموس:

يوضح الجدول رقم (٣) تأثير إضافة الفيتامينات (الريتينول أو حمض الاسكوربيك أو α توكوفيرول) إلى بيئة الانضاج المعمل على معدل الانضاج النووي لبويضات الجاموس. يتضح من النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المعاملات في نسبة البويضات التي وصلت لمرحلة (الحويصلة الجرثومية، إنكسار الحويصلة الجرثومية، الطور الاستوائي الأول، الطور الانفصالي الأول والطور النهائي الأول)، بينما كان هناك فروق معنوية في البويضات التي وصلت إلى مرحلة الطور الاستوائي الثاني حيث أعطت البيئة المضاف إليها الريتينول أعلى نسبة مئوية للبويضات التي وصلت إلى مرحلة الطور الاستوائي الثاني معنوية عن باقي البيئات (التوكوفيرول، الاسكوربيك والقياسية). أيضاً كان هناك فروق معنوية في كل من مجموع النسب المئوية للبويضات التي وصلت إلى مرحلة الطور النهائي الأول والطور الاستوائي الثاني ومجموع البويضات التي وصلت إلى الطور الانفصالي الأول والطور النهائي الأول والطور الاستوائي الثاني حيث كانت أعلى معنوية في البيئات المضاف إليها الريتينول، α -توكوفيرول والاسكوربيك عن البيئة القياسية.

جدول (٣): تأثير إضافة الفيتامينات إلى بيئة الانضاج المعمل على الانضاج النووي لبويضات الجاموس معملياً.

الخطأ المعياري (±)	بيئة الانضاج المعمل				المعاملة
	توكوفيرول	حمض لاسكوربيك	الريتينول	القياسية	
	١٠٠	١٢٢	١٣٠	١٤١	العدد الكلي للبويضات
					النسبة المئوية للبويضات (%):
١,٢٦	١,٣٤	٠,٠٠	١,٠٥	٣,١٤	الحويصلة الجرثومية
٢,٤٥	٣,٥٦	١,٩٠	٢,٢٣	٥,٨٣	إنكسار الحويصلة الجرثومية
٤,١١	١٣,١٦	١٥,٨٧	١٣,٢٧	٢٢,٥٧	الطور الاستوائي الأول
٢,١٤	٢,٦٦	٤,٢٧	٤,٢٣	٢,٠٠	الطور الانفصالي الأول (١)
٢,٦٦	٦,٩٠	٦,٠١	١,٧٠	٧,٠٣	الطور النهائي الأول (٢)
٤,٦٦	٧٢٢,٤٠	٧١١,٩١	٧٧,٥٧	٥٩٩,٤٦	الطور الاستوائي الثاني (٣)
٤,١٢	١٧٩,٢٨	١٧٧,٩٣	١٧٩,٢٧	٣٦٦,٤٧	٣ + ٢
٣,٦٦	١٨١,٩٤	١٨٢,٢٣	١٨٣,٤٨	٣٦٨,٤٦	٣ + ٢ + ١

الحروف الفوقية المختلفة ^{abc} ضمن نفس الصف تشير إلى اختلافات معنوية عند مستوى معنوية (≥ 0.005).

المناقشة

تم تقييم تأثير إضافة الريتينول أو حمض الاسكوربيك أو α -توكوفيرول كمضادات أكسدة غير إنزيمية إلى بيئة الانضاج المعمل على كل من معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي ومعدل الانضاج المعمل لبويضات الجاموس. أثبتت الدراسة الحالية ان كل الإضافات المستخدمة لها تأثير مفيد على انضاج البويضات معملياً والتي تم جمعها من مبايض اناث الجاموس المذبوحه بالمجازر في شكل زيادة غير معنوية في معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي وزيادة معنوية في معدل الانضاج النووي (النسبة المئوية للبويضات التي وصلت مرحلة الطور الاستوائي الثاني). مثل هذه النتائج تتفق مع كثير من الباحثين. في هذا المجال وجد (Miclea et al., 2008) أن إضافة ٢٠ مليمول من الفا توكوفيرول الى بيئة الانضاج المعمل أدت الى زيادة معنوية في معدل الانضاج المعمل لبويضات الخنازير. أيضاً وجد (Tao et al., 2010) ان إضافة ٥٠ أو ١٠٠ ميكرومول من توكوفيرول سهل من النضج السيتوبلازمي لبويضات الخنازير المعراة كلياً. بالاضافة الى ذلك فإن (Kitagawa et al., 2004; Jeong et al., 2006) وجدوا أن إضافة فيتامين هـ بتركيز ١٠٠

ميكرومول إلى بيئة الإنضاج المعملية لبويضات الخنازير قللت من عمليات الأكسدة وزادت في معدلات تكوين البلاستوسيسست عند الزراعة تحت ظروف إستزراع ٢٠% أوكسجين أو تحت ظروف إستزراع ٥% أوكسجين، على التوالي.

وفي اتجاه متوافق مع النتائج المتحصل عليها في الدراسة المقدمه وجد (Vahedi *et al.*, 2009) أن إضافة transretion acid (T-RA) بتركيزات (٠,٠٠, ٠,٢٥, ٠,٥٠, ١,٠٠ ميكرومول) إلى بيئة الإنضاج المعملية لبويضات الأبقار على كل من تمدد خلايا التراكم المبيضي ومعدل الإنضاج المعملية لم تؤثر معنويًا على تمدد خلايا التراكم المبيضي، بينما أدت إضافة واحد ميكرومول من T-RA إلى زيادة معنوية في معدل الإنضاج المعملية مقارنة بالمجموعة القياسية. أيضا في الجاموس وجد (Cajuday *et al.*, 2012) أن إضافة الريتينول بتركيزات (١, ٣ و ٥ ميكرومول) تزيد معدل تمدد خلايا التراكم المبيضي معنويًا في المجموعات المعاملة بحمض الريتنك (٨٠, ٨٠, ٦٧, ٨٠, ٨٦%)، على التوالي بالمقارنة بالمجموعة القياسية (٧٢,٠٢٤%). كان معدل البويضات التي وصلت إلى مرحلة النضج (الطور الإستوائي الثاني) أعلى معنويًا في المجموعة المعاملة بـ ٥ ميكرومول من حمض الريتنك (٨٤,٤٧%) بالمقارنة بالمجموعة القياسية (٦٧,٩٧%). أيضا أدت المعاملة بـ مايكرو مول حمض الريتنك إلى تحسن معنوي في نسبة البويضات التي وصلت إلى مرحلة البلاستوسيسست بالمقارنة بالمجموعة القياسية.

بالإضافة إلى ذلك درس (Hu *et al.*, 2012) تأثير إضافة فيتامين ج بتركيزات (٠, ٢, ٥, ١٠, ٢٠ و ٤٠ ميكروجرام/مل) إلى بيئة الإنضاج على ROS وعمليات الإخصاب والتطور المعملية لأجنة الخنازير. وجدوا أن نسبة الشوارد الحرة (ROS) قلت معنويًا في المعاملات المضاف إليها فيتامين ج بالمقارنة بالمجموعة القياسية وكان معدل تكوين البلاستوسيسست وعدد الخلايا الموجودة في كل جنين أعلى معنويًا في المجموعات المضاف إليها فيتامين ج بالمقارنة مع المجموعة القياسية. وكانت أفضل إضافة هي ٢٠ ميكروجرام/مل. كان الموت المبرمج للخلايا (Apoptosis) أقل في المجموعات المضاف إليها فيتامين ج بالمقارنة بالمجموعة القياسية. واستخلص الباحثون أن إضافة فيتامين ج أدت إلى تحسين في التطور المعملية لأجنة الخنازير نتيجة لتقليل مستوى ROS. كذلك درس (Ullah *et al.*, 2006) تأثير إضافة حمض الاسكوربيك بتركيز ٢٥٠ ميكرومول إلى بيئة الإنضاج المعملية لبويضات الجاموس المندمجة والمعراة. وجد هؤلاء الباحثين أن نسبة البويضات المعراة وصلت إلى نسبة معدل انضاج معملية أعلى بالمقارنة بالمجموعة القياسية. كانت النسبة المؤية للبويضات المضمحلة عالية معنوية في مجموعة البويضات المعراة مقارنة بالمجموعة القياسية (٢١,٤ مقابل ٧,٤%). واستخلص من هذا النتائج أن إضافة حمض الاسكوربيك أدت إلى زيادة معدل الإنضاج المعملية للبويضات المعراة وأيضًا وجود خلايا التراكم المبيضي يحمي البويضات من الاضمحلال. أيضًا أدت إضافة ٢٠ ميكرومول من الفا توكوفيرول و ٢٥٠ ميكرومول حمض الاسكوربيك إلى بيئة الإنضاج المعملية لبويضات الخنازير إلى نسبة عالية من تمدد خلايا التراكم المبيضي بالمقارنة بالمجموعة القياسية. كذلك وجد (Midea *et al.*, 2012) أن إضافة الفا توكوفيرول أدت إلى تأثير مفيد على كل من حيوية البويضة وتطورها إلى مرحلة الطور الإستوائي الثاني وحسنت معنويًا من تطور نسبة عالية من الاجنة إلى مرحلة الموريولا.

إضافة 9cis RA (9cis-Retinoic Acid) بتركيز (٥ و ٥٠ نانومول) إلى بيئة الإنضاج المعملية لبويضات الأبقار زاد من وصول البويضات إلى مرحلة البلاستوسيسست بالمقارنة بالمجموعة القياسية (١٨,٧ و ١٩,٢ مقابل ١٠,٥% على التوالي)، بينما إضافة 9cis RA بتركيز ٥ نانومول إلى بيئة الإنضاج لم يكن له تأثير إيجابي على حيوية البلاستوسيسست بعد عملية التجميد السريع (Gomez *et al.*, 2003). على العكس من النتائج السابقة في الأبحاث المرجعية أو في البحث المقدم فقد وجد بعض الباحثين نتائج معاكسة. في هذا الإتجاه وجد (Thiyagarajan and Valivittan, 2009) أن إضافة فيتامين هـ بتركيز (١٠٠ ميكرومول) إلى بيئة الإنضاج المعملية لبويضات الجاموس أطال فترة الإستزراع ولم تؤدي إلى اختلافات معنوية في معدل الإنقسامات أو نسبة البلاستوسيسست وذلك تحت ظروف إستزراع ٥% أوكسجين. أيضًا (Natarajan *et al.*, 2010) لم يجد أي تأثير معنوي لإضافة حمض الاسكوربيك بتركيزات (٠, ٥٠, ١٠٠, ٢٠٠, ٤٠٠ و ٥٠٠ ميكرومول) إلى بيئة الإنضاج المعملية لبويضات الأغنام على معدل إنضاج البويضات أو تطور الاجنة. بالإضافة إلى ذلك وجد (Dalvit *et al.*, 2005) أن إضافة فيتامين هـ مع أو فيتامين ج إلى بيئة الإنضاج لم يكن له تأثير معنوي على معدل الإنضاج المعملية لبويضات الأبقار، ولكن تركيز فيتامين هـ الموجود طبيعيًا داخل البويضات المندمجة إنخفض بمقدار النصف خلال عملية الإنضاج المعملية وعند إضافة فيتامين ج إلى بيئة الإنضاج بقيت نسبة فيتامين هـ ثابتة. أيضًا كانت تحتوي البويضات المنضجة مع فيتامين هـ والمنضجة مع فيتامين ج على كميات كبيرة من فيتامين هـ.

الخلاصة

نستخلص من هذه النتائج أن إضافة كل من الريتينول أو حمض الأسكوربيك أو α -توكوفيرول كمضادات أكسدة غير إنزيمية إلى بيئة الإنضاج المعملية يحسن من معدل تمدد خلايا التراكم المبيضى ويزيد معدل الإنضاج المعملية للبويضات الجاموس. وأن إضافة الريتينول أعطت أحسن معدل إنضاج معملية للبويضات الجاموس.

REFERENCES

- Ahlemeyer, B; Bauerbach, E; Plath, M; Steuber, M; Heers, C; Tegtmeier, F. and Krieglstein, J. (2001). Retinoic acid reduces apoptosis and oxidative stress by preservation of SOD protein level. *Free. Radic. Biol. Med.*, 30: 1067-1077.
- Cajuday, L. A; Herrera, A. A. and Duran, D. H. (2012). Effect of retinoic acid on the development of Water buffalo embryos *in vitro*. *Philipp. J. Vet. Anim. Sci.*, 38: 107-116.
- Dalvit, G; Llanes, S. P; Descalzo, A; Insani, M; Beconi, M. and Cetica, P. (2005). Effect of alpha-tocopherol and ascorbic acid on bovine oocyte *in vitro* maturation. *Reprod. Dom. Anim.*, 40: 93-97.
- Duncan, D.B. (1955). Multiple range and multiple "F" test. *Biometrics*, 11: 1-42.
- Feugang, J. M; Roover, R. D; Moens, A; Léonard, S; Dessy, F. and Donnay, I. (2004). Addition of β -mercaptoethanol or Trolox® at the morula/blastocyst stage improves the quality of bovine blastocysts and prevents induction of apoptosis and degeneration by prooxidant agents. *Theriogenology*, 61: 71-90.
- Fraga, C.G; Motchnik, P.A; Shigenaga, M.K; Helbock, H.J; Jacob, R.A. and Ames, B.N. (1991). Ascorbic acid protects against endogenous oxidative DNA damage in human sperm. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.*, 88:11003-11006.
- Gomez, E; Roriguez, A; Goyache, F; Diez, C; Joseroy, L; Moreira, P.N; Caamano, J.S; Moran, E. and Gutierrez-ada, A. (2004). Retinoid-dependent mRNA expression and poly-(A) contents in bovine oocytes meiotically arrested and/or matured *in vitro*. *J. Reprod. Dev.*, 69: 101-108.
- Gomez, E; Royo, L; Duque, P; Carneiro, G; Hidalgo, C; Goyache, F; Lorenzo, P. L; Alvarez, I; Facal, N. and Diez, C. (2003). 9-cis-Retinoic Acid During In Vitro Maturation Improves Development of the Bovine Oocyte and Increases Midkine but Not IGF-I Expression in Cumulus-Granulosa Cells. *Molecular Reproduction and Development*, 66:247-255.
- Guerin, P; El-Mouatassim, S; and Menezo, Y. (2001). Oxidative stress and protection against reactive oxygen species in the pre-implantation embryo and its surroundings. *Hum. Reprod. Update*, 7:175-189.
- Halliwell, B. and Gutteridge, J. M. C. (1989). The chemistry of oxygen radicals and other derived species. In: Halliwell B, Gutteridge JMC, editors. *Free radicals in biology and medicine*. 2nd edition. Oxford: Clarendon Press; pp 22-85.
- Hu, J; Cheng, D; Gao, X; Bao, J; Ma, X. and Wang, H. (2012). Vitamin C enhances the *in vitro* development of porcine pre-implantation embryos by reducing oxidative stress. *Reprod. Dom. Anim.*, 47: 873-879.

- Jeong, Y. W; Park, S. W; Hossein, M. S; Kim, S; Kim, J. H; Lee, S. H; Kang, S. K; Lee, B. C. and Hwang, W. S. (2006). Antiapoptotic and embryotrophic effects of α -tocopherol and L-ascorbic acid on porcine embryos derived from *in vitro* fertilization and somatic cell nuclear transfer. *Theriogenology*, 66:2104-2112.
- Kitagawa, Y; Suzuki, K; Yoneda, A. and Watanabe, T. (2004). Effects of oxygen concentration and antioxidants on the *in vitro* developmental ability, production of reactive oxygen species (ROS), and DNA fragmentation in porcine embryos. *Theriogenology*, 62:1186–1197.
- Kowaltowski, A. J. and Vercesi, A. E. (1999). Mitochondrial damage induced by conditions of oxidative stress. *Free. Radic. Biol. Med.*, 26: 463-471.
- Lopes, S; Jurisicova, A; Sun, J. G. and Casper, R. F. (1998). Reactive oxygen species: Potential cause for DNA fragmentation in human spermatozoa. *Hum. Reprod.*, 13: 896-900.
- Mahmoud, K.Gh.M. and Al-Shimaa Al-H.H. El-Naby (2013). Factors affecting buffalo oocytes maturation. *Global Veterinaria*, 11: 497-510.
- Miclea, I; Pacala, N; Zahan, M; Orlovshi, D; CĂRLEA, L. and Miclea, V. (2012). Alpha-Tocopherol and ascorbic acid combinations have a positive effect on the maturation of pig oocytes. *Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies*, 69: 269-276.
- Miclea, I; Zahan, M; Andrea, H; Miclea, V. and Roman, I. (2008). The effect of several α -tocopherol concentrations on swine oocyte maturation. *Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies*, 65: 366-370.
- Natarajan, R; Bhawani, S.M; and Munuswamy, D. (2010). Effect of α -tocopherol supplementation on *in vitro* maturation of sheep oocytes and *in vitro* development of preimplantation sheep embryos to the blastocyst stage. *J. Assist. Reprod. Genet.*, 27: 483–490.
- Pascoe, G; Olafs dottier, F. and Read, D. (1987). Vitamin E protection against chemical induced cell injury: Maintenance of cellular protein thiols as a cytoprotective mechanism. *Arch. Biochem. Biophys.*, 256: 150-158.
- SAS (2004). SAS/Stat. User's Guide Static's, Ver., 6.06 4th Ed. SAS Institute Inc. Cary, NC.
- Schweigert, F.J. and Zucker, H. (1988). Concentrations of vitamin A, β -carotene and vitamin E in individual bovine follicles of different quality. *J. Reprod. Fert.*, 82: 575-579.
- Tao, Y; Chen, H; Tian, N. N; Huo, D. T; Li, G; Zhang, Y. H; Liu, Y; Fang, F.G; Ding, J. P. and Zhang, X. R. (2010). Effects of L-ascorbic acid, α -tocopherol and co-culture on *in vitro* developmental potential of porcine cumulus cells free oocytes. *Reprod. Dom. Anim.*, 45: 19–25.
- Thiyagarajan, B. and Valivittan, K. (2009). Ameliorating effect of vitamin E on *in vitro* development of preimplantation buffalo embryos. *J. Assist. Reprod. Genet.*, 26:217–225.
- Ullah, L; Jalali, S; Khan, H; Shami, S. A. and Kiyani, M. M. (2006). Effect of L-ascorbic Acid on Ravi Buffal Oocytes During *in vitro* Maturation. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 9: 2369-2394.
- Vahedi, V; Zeinoaldini, S; Kohram, H. and Farahavar, A. (2009). Retinoic acid effects on nuclear maturation of bovine oocytes *in vitro*. *Afr. J. Biotechnol.*, 8: 3974-3978.
- Warren, S; Patel, S. and Kapron, C.M. (2000). The effect of vitamin E exposure on cadmium toxicity in mouse embryo cells *in vitro*. *Toxicology*, 142: 119-126.

EFFECT OF MATURATION MEDIA SUPPLEMENTED WITH RETINOL OR ASCORBIC ACID OR α -TOCOPHEROL ON CUMULUS CELL EXPANSION AND *IN VITRO* NUCLEAR MATURATION OF BUFFALO OOCYTES.

Khalil, W.A.; M.A. El-Hairry; A.E. Abdel-Khalek; and Z.M.R.K. Al-Palani.
Animal Production Dept., Faculty of Agric., Mansoura Univ.

ABSTRACT

The main objective of this study was to evaluate the effect of supplementing maturation media with, retinol (10 μ mol/ml), ascorbic acid (100 μ mol/ml) and α -tocopherol (100 μ mol/ml), on cumulus cell expansion and *in vitro* nuclear maturation of buffalo oocytes. Oocytes were collected from ovaries taken from slaughterhouses. Only compact oocytes were used for *in vitro* maturation by TCM-199 medium supplemented with different vitamin levels for 22 h in CO₂ incubator at 38.5 °C, 5% CO₂ and 95% humidity. Maturation rate was determined in terms of degree of expansion of cumulus cells and oocytes at metaphase-II (nuclear maturation). Results revealed that all supplements yielded higher percentages of oocytes showing full expansion of cumulus cells (77.2, 69.4 and 69.2% for tocopherol, ascorbic acid and retinol, respectively) as compared to control medium (60.2%), but the differences were not significant. Maturation rate in term of percentage of oocytes arrested at anaphase-I, telophase-I and metaphase-II was significantly higher for media supplemented with retinol, tocopherol and ascorbic acid, being 83.5, 82.2 and 81.94% as compared to 68.54% in control medium, respectively.

Conclusively, the present results may suggest that the supplementation of maturation medium (TCM-199) with retinol, ascorbic acid and α -tocopherol as a non enzymatic antioxidants had a beneficial effect on the cumulus cell expansion and nuclear maturation of buffalo oocytes. Retinol supplementation yielded the best results.

Keywords: Buffalo oocytes, *in vitro* maturation, non enzymatic antioxidants.

كلية الزراعة – جامعة المنصورة
مركز البحوث الزراعية

قام بتحكيم البحث
أ.د / أحمد ذكي محرز
أ.د / علاء فؤاد الدين محرز